

Über das Vorkommen von Jod in der Frauenmilch

Inaugural-Dissertation
zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
und einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Ludwig Maximilian Universität zu München

vorgelegt von

Alfons Reiß aus Regensburg.

1927

Druck von Michael Laßleben in Kallmünz bei Regensburg.

Aus der Universitäts=Kinderpoliklinik zu München.

Über das Vorkommen von Jod in der Frauenmilch

Inaugural=Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
und einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Ludwig Maximilian Universität zu München

vorgelegt von

Alfons Reiß aus Regensburg.

1927

Druck von Michael Laßleben in Kallmünz bei Regensburg.

Gedruckt mit Genehmigung der medizinischen Fakultät
der Universität München

Referent Herr Geheimrat Prof. Dr. Seitz.



Seinen lieben Eltern gewidmet!

Eingangs sei mir gestattet Herrn Geheimrat Professor Dr. Seitz für die gütige Überlassung des Themas, Herrn Dr. Maurer und Herrn Dr. Diez für die Anleitung und Korrektur zur Arbeit bestens zu danken.

Über das Vorkommen von Jod in der Frauenmilch.

Über die Zusammensetzung der Milch, besonders von Tieren (Kuhmilch) sind wir genau unterrichtet. Sie ist im wesentlichen nichts weiter wie eine Fettemulsion. Unter dem Mikroskop erweist sich die fertige Milch als aus dichtgedrängten feinen Fettröpfchen zusammengesetzt, welche in wasserklarem Serum suspendiert sind. Physikalisch-chemisch finden wir die Bestandteile in dreierlei Zuständen. Als Emulsion ist das Fett vorhanden. Die genaue chemische Konstitution des Letzteren ist noch nicht bekannt. Es ist lediglich eine Verbindung gemischter Triglyzeride, Cholesterine und Fettfarbstoffe. In Suspension, als dichtes Colloid, enthält die Milch den Käsestoff, der die Fettröpfchen in Emulsion hält, d. h. sie verhindert zu größeren Tropfen zusammenzufließen. Im gleichen Zustand befinden sich die Lactoglobuline, die Laktomuzine, die Lecithine und einzelne Enzyme. Als Lösung findet sich im Milchserum die Lactalbumine, der Milchzucker, die gelösten Salze und Gase, die Extraktiv-Stoffe, einige Enzyme, der Farbstoff und Spuren anderer Stoffe. Die Milchalche enthält: K, Na, Ca, Mg, Fe. In Spuren Mangan Aluminium, P_2O_5 , C L, CO_2 , H_2SO_4 und in Spuren Jod. Die Phosphorsäure und Schwefelsäure entstammen zum großen Teil den Eiweißkörpern, die Kohlensäure den organischen Säuren. Von letzteren ist am interessantesten das Vorkommen von Zitronensäure, weil diese bisher in keinem anderen tierischen Sekret nachgewiesen werden konnte. Ihre Bedeutung liegt darin, daß sie einen Teil der Kalkphosphate in Lösung hält. Ob sie in der Form von Phosphor-zitraten mit besonderen Eigenschaften vorhanden ist, steht noch nicht fest. Die bei der Veräufchung zurückbleibenden Salze sind natürlich keineswegs mit den in der Milch ursprünglich vorhandenen identisch. So wird z. B. aus dem Schwefel der Eiweißkörper, H_2SO_4 , aus dem Phosphor des Calciumsalzes, Phosphorsäure gebildet. Die vorhandenen organischen Säuren werden teils vollständig, teils mit Hinterlassung von Kohlensäure verbrannt. Die Milchalche zeigt eine deutliche alkalische Reaktion gegen Lakmuspapier und entwickelt beim Übergießen mit verdünnter Schwefelsäure nur wenig Kohlensäure. Den mutmaßlichen Gehalt an Salzen, der in einem Liter Milch vorhanden ist, gibt F. Söld-

ner auf Grund eingehender Untersuchungen folgendermaßen an: (Werte in gr Procent)

Chlornatrium	0,962
Chlorkalium	0,830
Monotkaliumphosphat	1,156
Dikaliumphosphat	0,835
Kaliumzitrat	0,495
Dimagnesiumphosphat	0 336
Magnesiumzitrat	0 367
Dikalziumphosphat	0,671
Trikalziumphosphat	0,806
Kalziumzitrat	2,133
Kalziumoxyd (an Kasein)	0,465.

Beachtenswert sind auch die Schwankungen in der Zusammenfetzung der Tagesmildh. Hier liegen genauere Untersuchungen von W. Fleischmann vor, der die einzelnen Gemelke einer Herde von etwa 150 Stück im Laufe eines Tages genau untersucht hat. Bei einer Temperatur von 15° C fand er folgende Schwankungen:

Spez. Gew.: 1,02905 – 1,03218

Fett in ‰: 2,569 – 3,818.

Fettfreie Trockensubstanz in Procenten: 8,2 – 8,933

Asche " " " 0,6 – 0,9.

Die Kenntnis über die genaue Zusammenfetzung der Frauenmildh ist leider noch nicht soweit gediehen, wie die der Kuhmildh. Das hängt von einer ganzen Reihe von Faktoren, hauptsächlich aber von der schwierigen Beschaffung ab. Frauenmildh stellt ebenfalls wie Kuhmildh eine undurchsichtige, weiße Flüssigkeit dar, die gegenüber der Kuhmildh mehr einen Stich ins gelbliche hat. Das rührt hauptsächlich von dem erhöhten Fettgehalt her. Das spezifische Gewicht beträgt im Mittel: 1,032. Die Reaktion ist amphoter. Die Hauptbestandteile sind wie bei der Kuhmildh: Eiweiß, Fett, Mildhzucker, Salze und Wasser. Die Gesamtasche beträgt 0,21 in Procenten der gesamten Flüssigkeit. Diese zuerst von Heubner und Hoffmann angegebene Zahl wird durch die zahlreichen und exakten Analysen von Camerer und Söldner bestätigt. Auch Lehmann fand einen Wert von 0,2‰. Die nähere Zusammenfetzung der Frauenmildh ist bisher nur wenig eingehend untersucht worden. Die erste ausführliche Arbeit stammt von Bunge. Er fand in 100 gr Asche folgende Durchschnittswerte in der Mildh vom 13. bis 15. Tag nach der Geburt:

K ₂ O	32,14 ‰
Na ₂ O	11,75 "
Ca O	15,67 "
Mg O	3,99 "
Fe ₂ O ₃	0,27 "
P ₂ O ₅	21,42 "
Cl	20,35 "

Andere Autoren fanden folgende Zahlen:

	Badhaus:	Kronheim:	de Lange:
K ₂ O	33,74 ‰	27,33 ‰	19,9 ‰
Na ₂ O	11,91 "	15,88 "	29,6 "
Ca O	17,36 "	15,52 "	12,9 "
Mg O	3,17 "	2,13 "	2,9 "
Fe ₂ O ₃	0,63 "	1,75 "	0,25 "
P ₂ O ₅	14,79 "	11,75 "	17,9 "
Cl	15,47 "	23,93 "	21,3 "

Es ergeben sich Differenzen nicht nur zwischen den einzelnen Untersuchungen, sondern auch bei verschiedenen Analysen desselben Autors, sodaß sich Durchschnittswerte bei der geringen Zahl von Arbeiten schwer errechnen lassen. Nur über einzelne wichtige Bestandteile liegen genauere Untersuchungen vor, so über Eisen, Chlor und Phosphor. Friedjung fand im Liter im Durchschnitt 5,09 mg Fe, das ist etwas mehr wie Blauberg und Söldner angeben. Chlor fand Freund zwischen 0,433 und 0,498 gr im Liter ähnlich wie bei Bunge. Über Phosphor stammen die besten Arbeiten von Schloßmann, der als Durchschnitt 0,461 gr P₂ O₅ im Liter fand und als Verhältnis von P₂ O₅ : zu N = 1 : 5,3 angibt. Die Frauenmilch enthält also 5 mal so viel Stickstoff als Phosphor. Der Phosphorgehalt wird von der Dauer der Laktation ebensowenig beeinflusst, wie von anderen klinischen Faktoren. Ausschlaggebend ist einzig und allein der Gehalt an Kasein. Bezüglich der Bindung, ob organisch oder anorganisch ist die Frage noch strittig. Nach Untersuchungen von Sickes sind 42,30/100 des gesamten P₂ O₅ Gehaltes organisch gebunden. Während Schloßmann dagegen nur etwa 1/5 des gesamten Phosphors in organischen Verbindungen fand.

Ein Wort noch zu den sogenannten Restsubstanzen. Das ist ein Hinweis dafür, daß in der Milch außer den bereits genannten noch andere Stoffe vorkommen, die wir noch nicht kennen. Besonders eingehend haben sich Camerer und Söldner mit dieser Frage beschäftigt. Anbei eine Tabelle über die gefundenen Durchschnittswerte:

Tag	Gesamt N	Fett	Laktose Anhydrit	Asche	Summe der Einzelbestandteile + 0,05 Zitr. S.	Trocken- substanz	Rest- substanz
5—6	0,287	3,26	5,83	0,3	9,44	12,09	2,65
8—11	0,271	3,11	6,16	0,28	9,6	12,12	2,52
20—40	0,204	3,91	6,52	0,22	10,7	12,48	1,78
60—140	0,172	3,31	6,81	0,19	10,36	11,79	1,43
170+etc.	0,148	3,2	6,78	0,18	12,21	11,44	1,23

Von der gesetzmäßigen Änderung der Milchezusammensetzung ist nur bekannt das geradlinige Ansteigen des Fettgehaltes während einer Brustentleerung und die zunehmende Verringerung von Eiweiß und Salzen im Laufe der ganzen Laktationsperiode wie Untersuchungen von Camerer und Söldner zeigen.

8—11 Tag	0,28	‰
29—40	„	0,22
60—140	„	0,19
170	„	0,18

Trunz fand ebenfalls ein deutliches Absinken der procentualen Eiweiß- und Salzwerte dann gegen Ende der Laktation bei fallender Milchmenge wieder zunehmende Konzentration des Eiweiß und Aschegehaltes zur alten Höhe. Fett- und Zuckergehalt bleiben während der ganzen Laktationszeit nach seinen Untersuchungen annähernd gleich. Im großen und ganzen kann man sagen, daß die Veränderungen der Milchmenge und des Fettgehaltes im umgekehrten Sinne erfolgen.

Die bisherigen Ausführungen beziehen sich ausschließlich auf die reife vollausgebildete Milch. Die Milch der ersten Tage nimmt schon grob morphologisch eine Sonderstellung ein, sie ist von intensiv gelber Farbe und dicklicher, schleimiger Konsistenz. Die Untersuchung der menschlichen Kolostralmilch ist wahrscheinlich wegen der schwierigen Materialbeschaffung sehr mangelhaft geblieben. Sie knüpft sich an die Namen: Simon 1838, Klemm 1845, Wernois und Bequerel 1853, Pfeiffer 1883, Camerer und Söldner 1896—98, Irtl 1896, Andrianse 1897, Guirand 1897, Charter-Richmond 1898, Engl 1906, Eichelberg 1906, Bauercifen 1910, Birk 1911. Leider stammen die umfangreichsten Untersuchungen aus früheren Jahren, so daß sie nicht mehr vollen Anspruch auf Gültigkeit haben. Das spez. Gewicht von Kolostralmilch ist 1,050—60. Neben der auffallenden gelben Farbe ist besonders das mikroskopische Bild recht charakteristisch. Außer, den auch in der reifen Milch vorhandenen Fettkügelchen, und unregelmäßig geformten Anhäufungen staubförmigen Fettes, erblickt man kleinere und größere scharf umrissene Gebilde, die von kleinen Fettröpfchen dicht

erfüllt sind. Es handelt sich hier um die zuerst von Donnee 1837 entdeckten und von ihm als *corps granuleux* bezeichneten Kolostralkörperchen. Czerny vertrat als erster die heute noch gültige Anschauung, daß es weiße Blutkörperchen seien, die mit größeren und kleineren Fettröpfchen angefüllt sind. Außerdem findet man Lymphozyten und in größerer Anzahl die sogenannten Halbmonde, das sind große Fettkugeln, denen kappenförmig, halbmondförmige Gebilde aufsitzen, welche auf Kernfarbstoffe reagieren. Die Kolostralkörperchen und die zuletzt genannten Gebilde verschwinden gewöhnlich 5–6 Tage nach der Geburt. Der charakteristische gelbe Farbstoff, soll nach Czerny an das Fett gebunden sein. Chemisch unterscheidet sich das Kolostrum schon in seiner gröberen Zusammensetzung von der Milch. Es liegen nur wenige Analysen vor, die im Prinzip gut übereinstimmen und zwar von Camerer und Söldner:

In 100 Teilen Kolostrum sind:

Stunden nach der Geburt		N	Fett	Zucker	Asche	Trocken- substanz
I. Bei denselben Frauen:	26 – 51	0,928	4,08	4,09	0,48	16,04
	51 – 61	0,508	3,92	5,48	0,41	14,12
II. Bei denselben Frauen:	26 – 48	0,336	1,67	5,2	0,36	10,32
	48 – 68	0,266	2,02	5,08	0,4	10,12
Milch	60 140	0,172	3,31	6,81	0,19	11,79
Mitte der Laktation.						

Die Tabelle zeigt, daß der Stickstoff stark erhöht ist, daß er den der reifen Milch etwa um das fünffache übertrifft. Im Fettgehalte sind die Schwankungen zu erheblich, um ein klares Bild zu geben. Die Menge des Zuckers ist verringert, die der Asche erhöht. Über den Stickstoff ist besonders charakteristisch, daß ein ungewöhnlich großer Teil davon koagulierbaren Eiweißkörpern angehört. Ein eingehendes Studium der Kolostralproteine ist wegen der damit verbundenen Schwierigkeiten noch nicht durchgeführt worden, da das Eiweiß der schwer zu beseitigenden Leukozyten berücksichtigt werden muß. Das Kolostralfett, welches Eichelberg und Engel untersucht, ist reicher an Ölsäuren, wie das der Milch, sodaß dadurch die Jodzahl bedeutend höhere Werte zeigt, und der des Körperfettes ungefähr gleichkommt. Der Übergang in das MilCHFett vollzieht sich oft kritisch, kann aber lange hinausgeschoben sein. Im Zusammenhange der vorliegenden Arbeit interessiert am meisten der Aschegehalt, der, wie bereits gesagt, gegenüber dem der Milch bedeutend erhöht ist und im Mittel etwa das zwei bis zweieinhalbfache der letzten Werte beträgt. Klemm fand in 100 gr:

8 Tage vor der Geburt	0,6355	‰	Asche	} von einer Frau;
1 Tag nach „ „	0,5118	„	„	
3 Tage nach der Geburt	0,2939	„	„	} von verschiede-
4 „ „ „ „	0,2095	„	„	
9 „ „ „ „	0,1691	„	„	

Pfeiffer fand feuerbeständige Salze (von verschiedenen Frauen):

1. Tag nach der Geburt	0,408	‰	Asche
2. „ „ „ „	0,340	„	„
3. „ „ „ „	0,321	„	„
4. „ „ „ „	0,283	„	„
5. „ „ „ „	0,249	„	„
6. „ „ „ „	0,203	„	„

Camärer und Söldner fanden:

26 – 51 Stunden nach der Geburt	0,48	‰	Asche	} bei der ersten
51 – 61 „ „ „ „	0,41	„	„	
26 – 48 „ „ „ „	0,36	„	„	} bei der zweiten
48 – 68 „ „ „ „	0,40	„	„	

Über die nähere qualitative Zusammensetzung der Salze stehen die Untersuchungen ebenfalls noch aus. Der Übergang in die reife Milch läßt sich zeitlich nicht genau festlegen. Grobchemisch pflegt der Ausgleich am 4. – 5. Tag einzutreten. Beim Versiegen der Milchsekretion nimmt das Sekret ganz die Merkmale der Vormilch wieder an.

Hinsichtlich der chemischen Zusammensetzung des Kuhkolostrums herrscht im Prinzip Übereinstimmung mit dem Kolostrum des Menschen. Eiweiß und Salze sind in vermehrter Menge vorhanden, Zucker ist vermindert, die Menge des Fettes ist wechselnd. Nach einer Untersuchung von Strickler hat Kuhkolostrum folgende Zusammensetzung.

Fettfreie Trockensubstanz	17,19	‰
Eiweiß	9,13	„
Fett	2,4	„
Cholesterin	0,05	„
Milchzucker	2,87	„
Asche	0,67	„

Die Zahlen wechseln etwas von Melkung zu Melkung. Es bestehen somit noch sehr große Lücken in der Kenntnis der Menge und Art der Kolostrum Bestandteile, sowohl beim Tier als beim Menschen. Rechnerisch ergibt sich eine gewisse Differenz, die auf die Existenz gewisser Restsub-

stanzen schließen lassen, die wir noch nicht kennen. Bachhaus und Cronheim schätzt sie in der Frauenmilch auf etwa 2 ‰.

Die physiologische Bedeutung des Jodes im normalen und pathologischen Stoffwechsel des Menschen hat in letzter Zeit eine große Anzahl interessanter Arbeiten und Theorien ins Leben gerufen. Die große Bedeutung, welche der Jodmangeltheorie des Kropfes in den letzten Jahren beigemessen wurden, gab Anlaß nachzuprüfen, in welcher Menge das Jod in der Natur überhaupt zu finden ist. Im Rahmen dieser Arbeit lag auch die Untersuchung, welche Mengen von Jod in der Kuh- und Frauenmilch enthalten sind. Die Mengen von Jod, die hier in Betracht kommen und festzustellen waren, sind ganz außerordentlich gering und betragen nur einige γ d. h. millionstel Gramm in 100 gr der untersuchten Substanz. Bisher war keine quantitative und qualitative chemische Methode bekannt, die so geringe Spuren von Jod mit Sicherheit nachweisen ließ. Es fehlte zwar nicht an Versuchen eine einigermaßen brauchbare Methode herauszuarbeiten. So befaßte sich schon um 1840 der franz. Forscher Ad. Chatin mit der Erforschung des Jodgehaltes zahlreicher Naturprodukte. Er wies mit Hilfe seiner Methode in fast allen Nahrungsmitteln und auch in der Luft und im Wasser Spuren von Jod nach. Seine komplizierte Untersuchungstechnik beruhte letzten Endes auf der Umwandlung von Palladiumjodüre in schwarzes P. Jodid. Seine Untersuchungen fanden jedoch keine Anerkennung, da man dieselben auf Verunreinigung der benützten Reagentien mit Jod zurückführte. Von Rabourdin wurde im Jahre 1850 das erste brauchbare colorimetrische Verfahren angegeben. In neuerer Zeit sind zahlreiche Arbeiten über den Jodgehalt pflanzlicher Stoffe erschienen. Winterstein untersuchte vorwiegend Phanerogamen. Er fand nur in 5 von 30 Fällen Jod in sehr geringen Mengen. Seine Mißerfolge sind hauptsächlich auf die zu geringe Menge der verwandten Untersuchungssubstanzen zurückzuführen. Er benutzte nämlich nur höchstens 30 gr lufttrockenes Material. Die ersten genaueren Angaben über den Jodgehalt der Luft hat A. Gauthier angegeben, der bis zu 0,0167 mg Jod pro cbm in der Meeresluft, in der Luft von Paris etwa 0,00135 mg pro cbm feststellte. Er fand nur Jodverbindung in fester wasserlöslicher Form. Die flüchtigen Jodverbindungen entgingen seinen Versuchen, da die verwandten Mengen ebenfalls zu gering waren. Auch Meerwasser wurde von ihm untersucht. Seine Analysen ergaben außerordentlich hohe Werte im Gegensatz zu anderen Forschern und betrugen bis zu 2,38 mg im Liter. Ganz neue Perspektiven für die Jodfrage wurden im Jahre 1895 von E. Baumann eröffnet. Er fand als integrierenden Bestandteil der Schilddrüse organisch gebundenes Jod und nannte es Thyrojodin. Erst Kendall klärte die genaue Konstitution dieser Verbindung auf. Es ist eine 456 Trihydro-, 456 Trijod-, 2 oxyindolpropionsäure,

die er als Tyroxin bezeichnete. Diese grundlegende Entdeckung veranlaßte ein Flut von neuen Untersuchungen und Theorien, auf die ich hier nicht näher eingehen kann. Die beste Methode zur Untersuchung dieser kleinsten Jodmengen, die hier in Frage kommen, hat der Schweizer Chemiker Fellenberg angegeben. Wir selbst haben nach dieser ausgezeichneten colorimetrischen Micro-Methode unsere sämtlichen Untersuchungen angestellt. Im Folgenden sei dieselbe kurz erläutert:

Vorbedingung ist vollständige Reinheit der verwandten Reagentien. Zur Verwendung gelangt destilliertes Wasser, Alkohol, Chloroform und Pottasche. Alle diese Reagentien enthalten mehr oder minder Spuren von Jod und müssen zur vollständigen Reinigung von dieser unerwünschten Beigabe einer entsprechenden Vorbehandlung unterzogen werden. Das destillierte Wasser wird mit etwas Pottasche versetzt und nochmals destilliert, das etwa vorhandene Jod bleibt dann im Rückstand. Alkohol und Chloroform werden auf dieselbe Art und Weise entjodet. Zur Reinigung der Pottasche verwendet man 80 % bereits vorbehandelten Alkohol, womit dieselbe mehrmals ausgeschüttelt wird. Die gereinigte Pottasche Lösung wird dann mit dem Scheidetrichter abgelassen und eingedampft. Das weitere Untersuchungsverfahren gestaltet sich dann folgendermaßen: In der zu untersuchenden genau abgemessenen Menge Milch müssen vorher die Fette verseift werden. Das geschieht am besten auf kaltem Wege. Man setzt der Milch etwa 25 % ihrer Trockensubstanz, Kaliumhydroxyd zu und läßt unter öfterem Umschütteln einige Tage stehen. Dann kocht man unter etwas Zusatz von Alkohol am Rückflußkühler, bis vollständige Klärung eintritt. Diese verseifte fast klare Lösung wird dann in einer Eisenschale eingedampft und versäht. Bei der Versäuerung ist zu beachten, daß schwache Rotglut nicht überschritten werden darf, da die sich etwa bildenden Jodide bei stärkerer Rotglut flüchtig sind. Durch öfteres Anfeuchten der Kohlestückchen mit etwas jodfreiem destilliertem Wasser wird der Versäuerungsprozeß wesentlich beschleunigt. Die zurückgebliebene fast rein graue Asche wird dann mit wenig Wasser etwa 3 mal ausgezogen, die Lösung filtriert, wobei darauf zu achten ist, daß möglichst wenig Substanz auf das Filter kommt. Das Filtrat darf nur leicht gelblich erscheinen nicht braun oder dunkel, da sonst noch nicht genügend versäuert ist. Der Rückstand in der Eisenschale wird nun schwach gegläht, dem Filtrat zum Schluß auch das Filter zugesetzt, eingedampft und nochmals versäuert. Es bleibt dann ein bräunlich-roter Rückstand, der zum großen Teil aus Eisenoxiden besteht und keine Kohlepartikelchen mehr enthalten darf. Dieser Glührückstand wird nun mit Alkohol mehrmals ausgezogen. Die Alkalijodide sind nämlich darin sehr leicht löslich, während die übrigen event. noch in Betracht kommenden Salze so gut wie unlöslich sind. Bei diesem Ausziehen ist die genauere Technik kurz

folgende: Man versetzt die Asche mehrereremale mit einigen ccm Alkohol, verreibt dieselbe mit einem Glaspistill und gießt die Lösung in eine Nickelschale über. Dabei muß der Rückstand durch Wasseraufnahme der Pottasche aus dem zugesetzten Alkohol schmierig werden. Ist er noch pulverig, so gibt man noch etwas Alkohol oder ein Tröpfchen Wasser zu. Den Auszug in der Nickelschale versetzt man noch mit 1–2 Tropfen Pottaschelösung und dampft auf dem Wasserbade ein. In den meisten Fällen ist nun die organische Substanz noch nicht vollständig zerstört, da der erste Rückstand wegen seiner schlechten Leitfähigkeit und wegen der Vorsicht, die man beim Glühen anwenden mußte, nicht überall genügend erhitzt worden ist.

Ein zweites schwaches Glühen ist notwendig. Die zugesetzte Pottasche verhindert bei einiger Vorsicht einen Verlust an Jodsalzen. Dieses Verfahren wird nochmals wiederholt und event. noch ein drittesmal geglüht. Nun wird zum letzten Mal mit Alkohol ohne Zusatz von Pottasche ausgezogen, derselbe in eine Platinschale überführt und zum letzten Mal ganz schwach geglüht. Es bleibt ein ganz geringer kaum sichtbarer rein weißer Rückstand. Derselbe besteht fast nur aus reinen Alkalijodiden. Man löst ihn nun in 0,4 ccm Wasser und gießt ihn in ein sogenanntes Jod=Ausfällungsröhrchen über, spült dann nochmals mit 0,4 ccm und ein drittes mal mit 0,2 nach, sodaß insgesamt 1 ccm Wasser zur Lösung verbraucht werden. Die verwendeten Röhrchen haben einen Durchmesser von etwa 5 mm, eine Höhe von 80 mm und sind oben schräg abgeschliffen, damit sie leicht gefüllt werden können. Der Inhalt ist etwa 2 ccm. Nun fügt man mit einer genau calibrierten 0,1 ccm fassenden Pipette, 0,02 ccm Chloroform hinzu und versetzt mit 1 Tropfen Nitrit-Schwefelsäure (hergestellt aus 10 ccm 3 n Schwefelsäure und 0,05 gr K N O₃), hält das Röhrchen zwischen Zeige- und Mittelfinger der einen Hand fast wagrecht und klopft mit dem Zeigefinger der anderen Hand in rascher Folge auf den unteren Teil. Der Chloroformtropfen schwimmt ursprünglich auf der wässerigen Flüssigkeit. Durch das Klopfen findet eine Zersprengung in kleinste Tröpfchen und gute Durchmischung statt. Dann wird zentrifugiert. Zum Kolorimetrischen Vergleich der durch freies Jod violett gefärbten Chloroformtropfen, stellt man sich passende Typen aus einer Stammlösung her, die in 100 ccm 13,7 mg K J entsprechend 10 mg Jod enthält. Man mißt mit einer 0,1 ccm fassenden Pipette die gewünschte Menge z. B. 0,01, 0,02, 0,03 etc. entsprechend 1, 2, 3 γ Jod in ein Ausfällungsröhrchen, verdünnt mit d. Wasser auf 1 ccm, setzt das Jod in der bereits obenbeschriebenen Weise in Freiheit und schüttelt mit Chloroform aus. Die Genauigkeit dieser Kolorimetrischen Vergleichsmethode schwankt von 0,3 bis 2 γ etwa um 0,1 γ , von 2–5 γ um 0,2–0,5 γ nach oben oder unten. Sie hängt auch ab von der Beleuchtung. Am besten ist helles zerstreutes Licht. An Fehlerquellen wären zu nennen:

Zu hohe Werte werden erzielt, wenn die Verbrennung nicht vollständig war und die Lösung noch etwas bräunlich gefärbt erscheint. Zu niedere Werte bekommt man, wenn unlösliche Salze, die Lösung etwas weißlich opalisieren lassen, sodaß das Violett des gefärbten Tropfens etwas abgeschwächt wird. Beide Fehlerquellen lassen sich bei einigermaßen sorgfältiger Arbeit vermeiden, wie auch die Genauigkeit der Ableseung durch fortgesetzte Übung sehr gesteigert werden kann.

Durch das Entgegenkommen der Frauenklinik war es nun möglich eine Reihe von Milchproben aus der Brust von Wöchnerinnen vor und nach der Geburt zu untersuchen. Die Proben wurden mehreremale des Tages abwechselnd von der rechten und linken Brustseite entnommen. Das Abpressen der Milch bereitete manchmal Schwierigkeiten, sodaß eine sanfte Gewalt oft nicht zu umgehen war, was natürlich einen wesentlichen Einfluß auf die Zusammensetzung der einzelnen Portionen ausüben mußte.

Von einer Wöchnerin St. vor der Geburt entnommene Proben:

20. 5. 1925	25	γ	0/0
22. 5. "	26	"	"
29. 5. "	32	"	"

Durchschnittswert dieser Kolostralmilch: 38,0 γ 0/0

Entbindung erfolgte 4. 6. 1925 nachts 10 Uhr.

Am 5. Juni 5 Proben und zwar:

2 Uhr	17,5	γ	0/0	
10 "	20	"	"	
3 "	17	"	"	
7 "	25,7	"	"	
11 "	23,3	"	"	Durchschnittswert an diesem Tag 20,7 γ 0/0.

Am 6. Juni 3 Proben

7 Uhr	17,8	γ	‰	
11 "	24,8	"	"	
3 "	8	"	"	Durchschnittswert 16,9 γ ‰

Am 7. Juni 3 Proben

7 Uhr	30	γ	‰	
11 "	4	"	"	
7 "	4	"	"	Durchschnittswert 12,7 γ ‰

Am 8. Juni 6 Proben

8 Uhr	4	γ	‰	
12 "	3	"	"	
3 "	17,5	"	"	
7 "	3,2	"	"	

10 Uhr	2,5	γ ‰	
12 "	6,3	" "	Durchschnittswert 6,1 γ ‰
Am 9. Juni	3	Proben	
7 Uhr	2,1	γ ‰	
11 "	3,5	" "	
7 "	6,5	" "	Durchschnittswert 4 γ ‰

Diese Proben ergeben auf Tage umgerechnet folgende Zahlen:

1. Tag	22 5	γ ‰
2. "	18 5	" "
3. "	12,7	" "
4. "	6	" "
5. "	4 6	" "

Fassen wir das Ergebnis der Untersuchung zusammen, so sehen wir kurz vor der Geburt einen sehr hohen Wert von annähernd 40 γ ‰ im Kolostrum. Die Vormilch, die in den ersten 24 Stunden nach der Geburt entleert wird, ist immer noch sehr reich an Jod etwa 23 γ ‰. Am 2. und 3. Wochenbetttag fällt der Jodspiegel steil ab bis auf 12 γ ‰. Am 4. Wochenbetttag auf 6 γ ‰. Dann folgt ein sanftes Abflachen gegen Ende der Kolostrumsperiode auf einen annähernd konstanten Wert von etwa 4 γ ‰, auf welcher Höhe sich der Jodgehalt nach den bisherigen Erfahrungen auch weiterhin gleichmäßig erhält. Setzt man die gewonnenen Zahlen in ein Koordinaten-System ein, so ergibt sich durch Verbindung der arithmetischen Mittelwerte der Ablauf einer geometrischen Kurve von anfänglich sehr steilem, dann immer gemäßigterem Abfall gegen den Zeitpunkt der endgültigen Umwandlung in die Dauermilch. Der Jodgehalt im menschlichen Kolostrum erniedrigt sich also im Laufe der ersten Stillwoche auf etwa 10 ‰ seiner ursprünglichen Höhe.

Angeichts dieser Ergebnisse schien es geboten, die Analysen an Tiermilch zu wiederholen und nachzuprüfen. Dank dem Entgegenkommen der Landwirtschaftlichen Hochschule Weihenstephan stand uns hiezu das alle 4 Stunden entnommene Gemelk einer frischentbundenen Kuh zur Verfügung. Die auf gleichem Wege wie bei der Frauenmilch erlangten Ergebnisse waren kurz folgende:

Am 1. Tag	16,5	γ ‰
" 2. "	3,5	" "
" 3. "	3 0	" "
" 4. "	2,5	" "


Es zeigt sich also, daß der Kurvenverlauf des Jodgehaltes im Kuhmilchkolostrum weitgehend übereinstimmt, mit den aus der Frühmilch von Frauen

ermittelten Zahlenreihen. Auch hier liegt die Anfangszahl nahe bei dem für die ersten 24 Stunden beim Menschen errechneten Mittelwert, ebenso weisen auch die Endwerte von Frauen- und Kuhmilch ähnliche Höhe auf und bewegen sich beide auf einer Konstanten.

Es scheint lediglich die Schnelligkeit der Senkung des Jodspiegels beim Tiere eine noch erheblichere zu sein als beim Menschen.

Im weiteren soll noch näher auf die festgestellte Kurve des Jodgehaltes im Kolostrum eingegangen werden, weil sie uns einige sehr interessante Perspektiven eröffnet. Betrachtet man das Bild der Kurve genauer, so sieht man den typischen Ablauf einer logarithmischen Kurve, wie er uns von vielen, besonders katalytischen Prozessen, bei denen das Massenwirkungsgesetz eine Rolle spielt, bekannt ist. Ähnliche Ergebnisse bei anderen Bestandteilen fand auch Grimmer bei seinen Untersuchungen über mathematische Gesetzmäßigkeiten beim Übergang des Kolostrums in die Milch. Das Ergebnis seiner sehr genauen und exakten Untersuchungen kurz zusammengefaßt lautet. Die Abnahme der Einzelbestandteile beim Übergang des Kolostrums in die Milch erfolgt proportional der Differenz der jeweilig vorhandenen Substanzmengen und ihrer Minimalmengen am Ende der Kolostralperiode, also nach einer sogenannten monomolekularen Gleichung. Am besten passen sich dem Gesetz die Menge der fettfreien Trockenmasse, die Gesamtstickstoffmengen und die Serumeiweißkörper an, während Kolostrumfett, Milchezucker und teilweise auch Kasein erhebliche Abweichungen von diesem Gesetz zeigen, ohne daß dafür bis jetzt Ursachen angegeben werden können. Sehr interessant ist es nun, daß auch die Kurve des Jodspiegels ähnlichen mathematischen Gesetzmäßigkeiten zu gehorchen scheint. Genau wie die Kurve der fettfreien Trockensubstanz, nähert sie sich gegen Ende der Kolostralperiode etwa zwischen der 90. und 100. Stunde nach der Geburt, einem Minimum, das sie mit einem kleinen Knick verläßt, um abermals einem Maximum zuzustreben, das bei beiden Kurven dann eine Konstante innerhalb gewisser Grenzen bildet. Trunz hat die Aschebestandteile von Kuhmilchkolostrum untersucht und seine Ergebnisse zeigen genau denselben typischen Kurvenverlauf.

Zum Schluß unserer Untersuchungen sei hier noch auf den biologischen Wert dieses bisher unbekannten Jodgehaltes kurz eingegangen. Parallel zu dem hohen Jodspiegel im Kolostrum kurz vor der Geburt, steht die außergewöhnliche Zunahme der Jodwerte im Blut von Schwangeren im letzten Drittel der Gravidität. Leider sind diese Untersuchungen noch nicht abgeschlossen, sodaß man noch kein einheitliches Bild über den Verlauf dieser Zunahme geben kann. Jedenfalls haben wir im 7. Monat Werte von 30–70 γ % gefunden. Nachdem Lange auch darauf hingewiesen hat, daß um diese Zeit auch die Schilddrüsen Vergrößerung in der



Kurve I: Fettfreie Trockensubstanz in g (in 100 ccm Kuhmilch Kolostr.)
(Nach Grimmer: Milchwirtschaftliche Forschungen 1924 II)

Kurve II: Prozentischer Gehalt des Kuhmilch-Kolostrums an Reinalshe.
(Nach Franz: Über die mineralischen Bestandteile der Kuhmilch etc.
Zeitschrift für physiolog. Chemie 1904, Bd. 40.)

Kurve III: Jodgehalt in Kuhmilch-Kolostrum in γ % in 100 ccm Kol.

Gravidität einzusetzen pflegt, also eine vermehrte Tätigkeit der Tyroidea anzunehmen ist, dürfen diese vorher angegebenen Zahlen nicht als reine Zufallsergebnisse angenommen werden. Nebenbei erwähnt ist am ersten Tag der Periode auch der Jodspiegel im Blut im Mittel bis zu 110 γ % erhöht und nach Weismann und Worontylsch fällt auch das Maximum der uns schon länger bekannten Anschwellung der Schilddrüse auf diesen Tag. —

Dieser kurze Ausblick auf eine Reihe weiterer noch nicht abgeschlossener Untersuchungen zeigt deutlich, welchen wichtigen biologischen Faktor diese geringe Jodmengen im Körperhaushalt der geschlechtsreifen Frau bedeuten, wenn wir auch letzten Endes die genaueren Zusammenhänge bis jetzt noch nicht übersehen können.

Literatur.

- Camerer und Söldner: Analysen der Frauenmilch, Kuhmilch und Stutenmilch, Zeitschrift für Biologie N. F. Bd. 15, Seite 135.
- Camerer und Söldner: die Bestandteile der Frauen- und Kuhmilch, Zeitschrift für Biologie N. F. Bd. 18.
- Balch und Baudnitz: Chemie und Physiologie der Milch, Ergebnisse der Physiologie, 2. Jahrgang 1903.
- Engelhorn: Schilddrüse, weibliche Geschlechtsorgane, habil. Sch. Erlangen 1912,
- St. Engl und J. Bauer: Die Biochemie und Biologie des Kolostrums. Aus: Ergebnisse der Physiologie XI. Jahrgang.
- Fellenberg: Untersuchungen über das Vorkommen von Jod in der Natur. Biochem. Zeitschrift 1923, Nr. 139.
- Fleischmann: Handbuch der Molkerei.
- Grimmer: Über mathematische Gesetzmäßigkeit usf. Milchwirtschaftl. Forschungen 1924, R. 2.
- de Lange: Die Zusammensetzung der Asche der Neugeborenen und der Muttermilch, Zeitschrift für Biologie, Bd. 40.
- de Lange: Die Beziehungen der Schilddrüse zur Schwangerschaft. Zeitschrift für Geb. und Gyn. 1899.
- Raudnitz: VI Sammelreferat über die Arbeiten aus der Milchchemie, Monatschrift für Kinderheilkunde Bd. IV, 1905.
- Siegfeld: Kolostrumanalysen, Hildesheimer Molkereizeitung 1908, Nr. 45.
- Sommerfeld: Handbuch der Milchkunde.
- Schloßmann: Über die Art, Menge und Bedeutung des Phosphors in der Milch, Archiv für Kinderheilkunde, Bd. 40.
- Trunz: Über die mineralischen Bestandteile der Kuhmilch usf. Zeitschr. für phys. Chemie 1904 Bd. 40.
- Worontysch: Wiener Klinische Wochenschrift 1914.

Lebenslauf.

Der Verfasser wurde am 18. August 1898 zu Voithenberg Bez.A. Waldmünchen, Oberpfalz, als der Sohn des Oberlehrers Hieronymus Reiß geboren. Nach der Versetzung seines Vaters nach Regensburg besuchte er dort die Volksschule und Kreisoberrealschule bis zur 7. Klasse einschließlich. Am 15. Juli 1917 wurde der Verfasser dann zum Kriegsdienst eingezogen. Nach der Entlassung aus dem Heeresdienst im Dezember 1918 trat er in den Kriegskurs A der früher besuchten Anstalt über und erlangte dort im Juli 1919 die Reife. Im Oktober 1919 bezog dann der Verfasser die Ludwig-Maximilian Universität in München, an der er auch sein medizinisches Studium vollendete. In den Semesterferien betätigte er sich hauptsächlich als Werkstudent, um die Eltern bei der Bestreitung der Studienkosten etwas zu entlasten. Das ärztliche Vorexamen legte er im Wintersemester 1921/22 ab und nach 10 Semestern am 23. Dezember 1924 das medizinische Staatsexamen.

Im Verlauf des praktischen Jahres betätigte sich der Verfasser vom 1. Januar 1925 bis 15. August 1925 an der Universitäts-Kinderpoliklinik in München bei Geheimrat Prof. Dr. Seitz. Am selben Institut bearbeitete er auch seine vorliegende Dissertation. Am 15. August 1925 trat er dann an die Medizinische Poliklinik zu Prof. Dr. May über und befaßte sich vorwiegend mit der Erkennung und Behandlung innerer Krankheiten. Nach Abolvierung des praktischen Jahres erlangte der Verfasser am 31. Dezember 1925 die Approbation als Arzt in München. Von da ab widmete er sich dem Spezial-Studium der Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universitäts-Frauenklinik in München bei Geheimrat Prof. Dr. Döderlein. Der Verfasser befindet sich zur Zeit noch an derselben Anstalt als Volontärarzt.

